Abiturprüfung Berufliche Oberschule 2008

• Mathematik 13 Technik - A II - Lösung

Teilaufgabe 1.0

Gegeben sind die Funktionen f_a mit $f_a(x) = \frac{(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}}{1 + x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}}$ sowie die Integralfunktion F_a mit

$$F_a(x) = \int_0^x f_a(t) dt \text{ mit } x \in \mathbb{R} \text{ und } a \in \mathbb{R}^+.$$

Teilaufgabe 1.1 (9 BE)

Bestimmen Sie die Nullstelle von f_a und durch eine geeignete Rechnung das Verhalten der Funktionswerte $f_a(x)$ an den Rändern der Definitionsmenge in Abhängigkeit von a .

$$f_a(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 + a \cdot x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_0 = \frac{-1}{a}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}}{1 + x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}} \text{ annehmen, } a > 0 \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}}{1 + x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}} \text{ annehmen, } a > 0 \rightarrow 0$$

Schritt für Schritt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}}{1 + x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}} \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{L'Hosp.}}}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{a \cdot e^{a \cdot x} + (1 + a \cdot x) \cdot a \cdot e^{a \cdot x}}{2 \cdot x \cdot e^{2 \cdot a \cdot x} + x^2 \cdot 2 \cdot a \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}} \right] = \blacksquare$$

$$\blacksquare = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{a + a + a^2 \cdot x}{e^{a \cdot x} \cdot (2 \cdot x + 2 \cdot a \cdot x^2)} \right] \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{L'Hosp.}}}{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^2}{a \cdot e^{a \cdot x} \cdot (2 \cdot x + 2 \cdot a \cdot x^2) + e^{a \cdot x} \cdot (2 + 4 \cdot a \cdot x)} = 0$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $\infty \quad \infty \quad \quad \quad \infty \quad \quad \infty$

$$\begin{array}{c}
 0 \quad \text{Nebenrechnung 1} \\
 \uparrow \\
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}}{1 + x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{0}{1} = 0 \\
 \downarrow \\
 0 \quad \text{Nebenrechnung 2}
 \end{array}$$

Nebenrechnung 1:

$$\begin{array}{c}
 -\infty \\
 \uparrow \quad \text{L'Hosp.} \\
 \lim_{x \rightarrow -\infty} [(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 + a \cdot x}{e^{-a \cdot x}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a}{-a \cdot e^{-a \cdot x}} = 0 \\
 \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\
 \infty \qquad \qquad \qquad \infty
 \end{array}$$

Nebenrechnung 2:

$$\begin{array}{c}
 \infty \qquad \qquad \qquad \infty \\
 \uparrow \quad \text{L'Hosp.} \quad \uparrow \\
 \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{e^{-2 \cdot a \cdot x}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 \cdot x}{-2 \cdot a \cdot e^{-2 \cdot a \cdot x}} = \blacksquare \\
 \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\
 \infty \qquad \qquad \qquad \infty
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \blacksquare = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{4 \cdot a^2 \cdot e^{-2 \cdot a \cdot x}} = 0 \\
 \downarrow \\
 \infty
 \end{array}$$

Teilaufgabe 1.2 (4 BE)

Ermitteln Sie die x-Werte, für die der Graph von f_a oberhalb bzw. unterhalb der x-Achse verläuft.

Das Vorzeichen von $f_a(x)$ wird bestimmt durch den Term $1 + a \cdot x$.

$$1 + a \cdot x > 0 \quad \left| \begin{array}{l} \text{annehmen, } a > 0 \\ \text{auflösen, } x \end{array} \right. \rightarrow -\frac{1}{a} < x$$

$$1 + a \cdot x < 0 \quad \left| \begin{array}{l} \text{annehmen, } a < 0 \\ \text{auflösen, } x \end{array} \right. \rightarrow -\frac{1}{a} < x$$

G_{f_a} liegt oberhalb der x-Achse für $x > -\frac{1}{a}$, G_{f_a} liegt unterhalb der x-Achse für $x < -\frac{1}{a}$.

Teilaufgabe 1.3 (5 BE)

Bestimmen Sie, ohne die Integration durchzuführen, das Monotonieverhalten und eventuelle Extremstellen des Graphen von F_a und deren Art.

$$F'_a(x) = f_a(x)$$

G_{F_a} ist streng monoton fallend für $x < -\frac{1}{a}$, G_{F_a} ist streng monoton steigend für $x > -\frac{1}{a}$.

Der Graph von F besitzt an der Stelle $x_T = -\frac{1}{a}$ ist einen Tiefpunkt.

Teilaufgabe 1.4 (5 BE)

Zeigen Sie, dass die Funktion h_a mit $h_a(x) = \arctan(x \cdot e^{a \cdot x})$, $x \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^+$ eine Stammfunktion

der Funktion f_a ist, und begründen Sie, dass gilt: $F_a = h_a$

$$h_a(x) = \arctan(x \cdot e^{a \cdot x})$$

$$h'_a(x) = \frac{1}{1 + (x \cdot e^{a \cdot x})^2} \cdot (e^{a \cdot x} + a \cdot x \cdot e^{a \cdot x}) = \frac{(1 + a \cdot x) \cdot e^{a \cdot x}}{1 + x^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot x}} = f_a(x)$$

$$F_a(x) = \int_0^x \frac{(1 + a \cdot t) \cdot e^{a \cdot t}}{1 + t^2 \cdot e^{2 \cdot a \cdot t}} dt \quad F_a(x) = \arctan(x \cdot e^{a \cdot x}) - \arctan(0) = h_a(x)$$

Teilaufgabe 1.5 (7 BE)

Geben Sie für $F_1 = h_1$ die Nullstelle und für den Graphen von F_1 die Koordinaten und Art des Extrempunkts an. Zeichnen Sie den Graphen von F_1 im Bereich $-3 \leq x \leq 3$ unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse (1·LE = 2·cm).

$$h_1(x) := \operatorname{atan}(x \cdot e^x)$$

$$h_1(x) = 0 \quad \text{Nullstelle:} \quad x_0 = 0$$

$$\text{Tiefpunkt:} \quad x_T = -1 \quad h_1(-1) \rightarrow -\operatorname{atan}(e^{-1}) = -0.353$$

Teilaufgabe 1.6 (3 BE)

Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow \infty} F_1(x)$.

Welcher Flächeninhalt lässt sich mithilfe dieses Grenzwertes angeben?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{atan}(x \cdot e^x) = \frac{\pi}{2}$$

Der Graph von f_1 und die x-Achse begrenzen im 1. Quadranten des Koordinatensystems eine Fläche, die sich nach rechts ins Unendliche erstreckt. die Maßzahl des Flächeninhalts dieser Fläche beträgt $\frac{\pi}{2}$.

Teilaufgabe 2 (6 BE)

Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) := x \cdot \sqrt{e^2 - e^x}$ mit $x \in [0; 2]$.

Aus einem hinreichend dicken Holzstück wird ein Körper gedreht, dessen Längsschnitt von dem Graphen von g und dessen Spiegelbild bezüglich der x -Achse begrenzt wird.

Berechnen Sie die Maßzahl V des Volumeninhalts.

$x_1 := 0, 0.01 \dots 2$

$$V = \pi \cdot \int_0^2 (g(x))^2 dx = \pi \cdot \int_0^2 x^2 (e^2 - e^x) dx$$

$$V = \pi \cdot \left(\int_0^2 e^2 \cdot x^2 dx - \int_0^2 x^2 \cdot e^x dx \right)$$

Nebenrechnung:

$$\int x^2 \cdot e^x dx = x^2 \cdot e^x - \int 2 \cdot x \cdot e^x dx = x^2 \cdot e^x - 2 \cdot x \cdot e^x + \int 2 \cdot e^x dx = x^2 \cdot e^x - 2 \cdot x \cdot e^x + 2 \cdot e^x$$

$$u(x) = x^2$$

$$u'(x) = 2 \cdot x$$

$$u(x) = 2 \cdot x$$

$$u'(x) = 2$$

$$v'(x) = e^x$$

$$v(x) = e^x$$

$$v'(x) = e^x$$

$$v(x) = e^x$$

$$V = \pi \cdot \left[e^2 \cdot \frac{2^3}{3} - \left(2^2 \cdot e^2 - 2 \cdot 2 \cdot e^2 + 2 \cdot e^2 - 2 \cdot e^0 \right) \right] = \pi \cdot \left[\frac{8}{3} \cdot e^2 - \left(2 \cdot e^2 - 2 \right) \right] = \pi \cdot \left(2 + \frac{2}{3} \cdot e^2 \right)$$

Teilaufgabe 3

In der folgenden Aufgabe soll die Differentialgleichung für die Teilchenzahl $n(t)$ der Tochter-substanz eines radioaktiven Mutter-Tochter-Zerfalls untersucht werden. Von der radioaktiven Muttersubstanz mit der Zerfallskonstanten $\lambda_M > 0$ liegen zur Zeit $t = 0$ N_0 Atome vor.

Die ebenfalls radioaktive Tochtersubstanz zerfällt mit der Zerfallskonstanten $\lambda_T = 0$.

Für die Teilchenzahl $n(t)$ der Tochtersubstanz gilt für $t \geq 0$ folgende Differentialgleichung:

$$n'(t) = \lambda_M \cdot e^{-\lambda_M \cdot t} - \lambda_T \cdot n(t).$$

Teilaufgabe 3.1 (6 BE)

Bestimmen Sie die Lösung $n(t)$ für $\lambda_M = \lambda_T = \lambda$ mithilfe der Variation der Konstanten, wenn gilt:

$$n(0) = 0.$$

Gegebene inhomogene DGL: $n' = \lambda_M \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_M \cdot t} - \lambda_T \cdot n$

Mit $\lambda_M = \lambda_T = \lambda$: $\Rightarrow n' = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} - \lambda \cdot n$

Inhomogene DGL: $n' + \lambda \cdot n = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

Homogene DGL: $n' + \lambda \cdot n = 0$

Differentialquotient: $\frac{dn}{dt} = -\lambda \cdot n$

Trennen der Variablen: $\frac{dn}{n} = -\lambda \cdot dt$

Integration: $\int \frac{1}{n} dn = \int -\lambda dt + k \rightarrow \ln(|n|) = k - \lambda \cdot t$

Da $n > 0$ $n = e^{-\lambda \cdot t + k}$

Allgemeine Lösung des homogenen Systems: $n_H(t) = K \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

Variation der Konstanten: $n_S(t) = K(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

Ableitungsfunktion: $n'_S(t) = K'(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t} + K(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot (-\lambda)$

Einsetzen in die inhomogene DGL: $n' + \lambda \cdot n = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

$$K'(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t} + K(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot (-\lambda) + \lambda \cdot (K(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t}) = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \rightarrow K'(t) \cdot e^{-\lambda \cdot t} = N_0 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

$$\Rightarrow K'(t) = N_0 \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow K(t) := \int N_0 \cdot \lambda dt$$

Integration: $K(t) = N_0 \cdot \lambda \cdot t$

Allgemeine Lösung des inhomogenen Systems:

$$n_A(t) = K \cdot e^{-\lambda \cdot t} + N_0 \cdot \lambda \cdot t \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

Bestimmung von K durch Einsetzen der Anfangsbedingung: $n_A(0, K) = 0$

$$K := K \quad K \cdot e^0 + N_0 \cdot \lambda \cdot 0 \cdot e^0 = 0 \text{ auflösen, } K \rightarrow 0$$

Partikuläre Lösung: $n_P(t) = N_0 \cdot \lambda \cdot t \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

Teilaufgabe 3.2 (8 BE)

Lösen Sie nun obige Differentialgleichung für $n(t)$ für $\lambda_M \neq \lambda_T$, wenn ebenfalls gilt: $n(t) = 0$.

[Ergebnis: $n(t) = \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot (e^{-\lambda_M \cdot t} - e^{-\lambda_T \cdot t})$]

$$\lambda_T \neq \lambda_M$$

Gegebene inhomogene DGL: $n' = \lambda_M \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_M \cdot t} - \lambda_T \cdot n$

Homogene DGL: $n' + \lambda_T \cdot n = 0$

Differentialquotient: $\frac{dn}{dt} = -\lambda_T \cdot n$

Trennen der Variablen: $\frac{dn}{n} = -\lambda_T \cdot dt$

Integration: $\int \frac{1}{n} dn = \int -\lambda_T dt + k \rightarrow \ln(|n|) = k - t \cdot \lambda_T$

Da $n > 0$ $n = e^{-\lambda_T \cdot t + k}$

Allgemeine Lösung des homogenen Systems: $n_H(t) = K \cdot e^{-\lambda_T \cdot t}$

Variation der Konstanten:
$$n_S(t) = K(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t}$$

Ableitungsfunktion:
$$n'_S(t) = K'(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} + K(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} \cdot (-\lambda_T)$$

Einsetzen in die inhomogene DGL:
$$n' + \lambda_T \cdot n = \lambda_M \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_M \cdot t}$$

$$K'(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} + K(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} \cdot (-\lambda_T) + \lambda_T \cdot (K(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t}) = \lambda_M \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_M \cdot t}$$

Vereinfacht und aufgelöst:

$$K'(t) \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} = N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{-\lambda_M \cdot t} \text{ auflösen, } K'(t) \rightarrow N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot \lambda_T} \cdot e^{-t \cdot \lambda_M}$$

$$\Rightarrow K'(t) = N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (\lambda_T - \lambda_M)}$$

$$\Rightarrow K(t) = \int N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (\lambda_T - \lambda_M)} dt$$

Integration:
$$\int N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (\lambda_T - \lambda_M)} dt = \frac{N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (\lambda_T - \lambda_M)}}{\lambda_T - \lambda_M}$$

$$K(t) = \frac{N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (\lambda_T - \lambda_M)}}{\lambda_T - \lambda_M}$$

Allgemeine Lösung des inhomogenen Systems:

$$n_A(t) = K \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} + \left[\frac{N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (\lambda_T - \lambda_M)}}{\lambda_T - \lambda_M} \right] \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} = K \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} + \left[\frac{N_0 \cdot \lambda_M \cdot e^{t \cdot (-\lambda_M)}}{\lambda_T - \lambda_M} \right]$$

$$n_A(t) = K \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} + \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_M \cdot t}$$

Bestimmung von K durch Einsetzen der Anfangsbedingung: $n_A(0, K) = 0$

$$K := K \quad K \cdot e^0 + \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot e^0 = 0 \text{ auflösen, } K \rightarrow -\frac{N_0 \cdot \lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M}$$

Partikuläre Lösung:
$$n(t) = \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} + \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda_M \cdot t}$$

$$n(t) = \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot \left(-e^{-\lambda_T \cdot t} + e^{-\lambda_M \cdot t} \right)$$

Teilaufgabe 3.3 (8 BE)

Begründen Sie für den Fall $\lambda_M \neq \lambda_T$ in Abhängigkeit von λ_M und λ_T ohne Verwendung von $n'(t)$, dass $n(t)$ ein absolutes Maximum besitzt.

Berechnen Sie nun den Zeitpunkt $t_{\max}$ mithilfe von $n'(t)$.

Definitionsmenge von $n(t)$: $t \in [0; \infty[$

linker Randwert: $n(0) = 0$

rechter Randwert:
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot \left(-e^{-\lambda_T \cdot t} + e^{-\lambda_M \cdot t} \right) \right] = 0$$

Funktion ist stetig und besitzt auf dem linken Rand sowie auf dem rechten Rand den Funktionswert Null, d. h. es muss ein absolutes Maximum geben.

Ableitungsfunktion:
$$n'(t) = \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} \cdot N_0 \cdot \left(\lambda_T \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} - \lambda_M \cdot e^{-\lambda_M \cdot t} \right)$$

Horizontale Tangenten: $n'(t) = 0$

$$\Leftrightarrow \lambda_T \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} - \lambda_M \cdot e^{-\lambda_M \cdot t} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_T \cdot e^{-\lambda_T \cdot t} = \lambda_M \cdot e^{-\lambda_M \cdot t}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\lambda_T}{\lambda_M} = \frac{e^{-\lambda_M \cdot t}}{e^{-\lambda_T \cdot t}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\lambda_T}{\lambda_M} = e^{\lambda_T \cdot t - \lambda_M \cdot t}$$

$$\Leftrightarrow \lambda_{\text{T}} \cdot t - \lambda_{\text{M}} \cdot t = \ln \left(\frac{\lambda_{\text{T}}}{\lambda_{\text{M}}} \right)$$

$$\Leftrightarrow (\lambda_{\text{T}} - \lambda_{\text{M}}) \cdot t = \ln \left(\frac{\lambda_{\text{T}}}{\lambda_{\text{M}}} \right)$$

$$t_{\text{max}} = \frac{\ln \left(\frac{\lambda_{\text{T}}}{\lambda_{\text{M}}} \right)}{\lambda_{\text{T}} - \lambda_{\text{M}}}$$

Modellfunktion zu: $n(t) := \frac{\lambda_{\text{M}}}{\lambda_{\text{T}} - \lambda_{\text{M}}} \cdot N_0 \cdot (-e^{-\lambda_{\text{T}} \cdot t} + e^{-\lambda_{\text{M}} \cdot t})$